

対象疾患	レジメン名
大腸癌	XELOX + Bev 療法

### 使用抗がん剤

No.	抗がん剤名	投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	アバスチン注	5~10mg/kg	DIV	90分	d1
2	エルプラット注	130mg/m <sup>2</sup>	DIV	120分	d1
3	ゼローダ錠	2000mg/m <sup>2</sup>	p.o	14日間	d1~d14
4					
5					

投与間隔(1コース期間): 3週間

コース間での休薬期間: 1週間

総コース数: 効果が認められる間(術後補助化学療法では8コースまで)

特記事項: ゼローダ: d1の夕~d15の朝まで服用

デカドロン錠(0.5)16T/×2(d2~d3)

### プロトコール

Rp.	薬剤名	投与量	コメント
Rp.1	生食 (ルートキープ)	100mL	
Rp.2	アロキシ静注バッグ(0.75) デカドロン注(3.3)	1キット 2A	15分
Rp.3	生食(100) 硫酸Mg補正液(20) カルチコール(5)	100mL 1A 2A	30分
Rp.4	アバスチン注 生食(100)	上記投与量 100mL	90分 (インフュージョンリアクションがなければ、2 コース目は60分、3コース目以降は30分)
Rp.5	エルプラット注 5%Glu(250)	上記投与量 250mL	120分