

対象疾患	レジメン名
胃癌	PTX+RAM(3週投与→1週休薬)

### 使用抗がん剤

No.	抗がん剤名	投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	サイラムザ注	8mg/Kg	DIV	60分	d1、d15
2	パクリタキセル注	80mg/m <sup>2</sup>	DIV	60分	d1、d8、d15
3					
4					
5					

投与間隔(1コース期間): 4週間

コース間での休薬期間: 1週休薬

総コース数: 効果が認められる間

特記事項: 0.22μ以下のメンブランフィルターを使用すること

d8 : Rp.4、5を省く(Rp.6は30分)

### プロトコール

Rp.	薬剤名	投与量	コメント
Rp.1	生食 (ルートキープ)	100mL	
Rp.2	アロキシ静注バッグ(0.75) デカドロン注(3.3)	1キット 2A	15分
Rp.3	ガスター注(20) ポラミン注(5) 生食(20)	1A 1A 20mL	
Rp.4	生食(20) フラッシュ用	20mL	
Rp.5	サイラムザ注(100) 生食(250)	上記投与量 250mL(全量)	60分 Rp.5は全量を250mLとする
Rp.6	生食(100)	100mL	60分(インフュージョンリアクション経過観察) 2コース目まで60分必須 3コース目以降30分で可
Rp.7	パクリタキセル「NK」(100) 5%Glu(250)	上記投与量 250mL	60分
Rp.8	生食(50) フラッシュ用	50mL	

対象疾患	レジメン名
胃癌	PTX+RAM(3週投与→1週休薬)

### 使用抗がん剤

No.	抗がん剤名	投与量	投与方法	投与時間	投与日
-----	-------	-----	------	------	-----

1	パクリタキセル注	80mg/m <sup>2</sup>	DIV	60分	d1、d8、d15
2					
3					
4					
5					
投与間隔(1コース期間): 4週間					
コース間での休薬期間: 1週休薬					
総コース数: 効果が認められる間					
特記事項: 0.22 μ 以下のメンブランフィルターを使用すること					

### プロトコール

Rp.	薬剤名	投与量	コメント
Rp.1	生食 (ルートキープ)	100mL	
Rp.2	アロキシ静注バッグ(0.75) デカドロン注(3.3)	1キット 2A	15分
Rp.3	ガスター注(20) ポララミン注(5) 生食(20)	1A 1A 20mL	
Rp.4	生食(100)	100mL	30分
Rp.5	パクリタキセル「NK」(100) 5%Glu(250)	上記投与量 250mL	60分
Rp.6	生食(50) フラッシュ用	50mL	