

| | |
|------|--------|
| 対象疾患 | レジメン名 |
| 食道癌 | DCF 療法 |

使用抗がん剤

| No. | 抗がん剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|-----|---------|----------------------|------|------|-------|
| 1 | タキソテール注 | 50mg/m ² | DIV | 60分 | d1 |
| 2 | 5-FU注 | 700mg/m ² | DIV | 24時間 | d1～d5 |
| 3 | ブリプラチン注 | 70mg/m ² | DIV | 120分 | d1 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

投与間隔(1コース期間): 3週間 * d6: ジーラスタ皮下注投与

コース間での休薬期間: 16日間

総コース数: 効果が認められる間

特記事項: 5-FUとシスプラチンは同時投与。 D2: デカロン注2A+生食100を30分→5-FU+生食500を24時間 D3: デカロン注1A+生食100を30分→5-FU+生食500を24時間 D4、D5: 5-FU+生食500を24時間

プロトコール

| Rp. | 薬剤名 | 投与量 | コメント |
|-------|-------------------------------|---|------|
| Rp.1 | ST3(500) 硫酸Mg補正液(20) | 500mL 1A | 90分 |
| Rp.2 | 20%マンニトール(300) | 300mL | 30分 |
| Rp.3 | プロイメド(150) 生食(100) | 1V 100mL | 30分 |
| Rp.4 | アロキシ静注バッグ(0.75) デカロン注(3.3) | 1キット 2A | 30分 |
| Rp.5 | タキソテール注 5%Glu(250) | 上記投与量 250mL | 60分 |
| Rp.6 | 5-FU注 生食(500) | 上記投与量 500mL | 24時間 |
| Rp.6' | ブリプラチン注 生食(500) | 上記投与量 500mL | 120分 |
| Rp.7 | プリンペラン注 生食(100) | 2A 100mL | 60分 |
| Rp.8 | ST3(500) | 500mL | 3時間 |
| Rp.9 | フィジオ35(500) | 500mL | 3時間 |